



PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE MATRONA DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.

Resolución de 18 de diciembre de 2008 (BOA número 3 de 7 de enero de 2009)

Categoría: MATRONA

ADVERTENCIAS:

- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha).
- Este cuestionario consta de 110 preguntas de las cuales las 10 últimas son de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la «Hoja de Examen» entre los números 1 y 110.


Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.

IMPORTANTE: Los aspirantes del turno de promoción interna, estarán exentos de contestar a las preguntas número: **17, 40, 64, 75 y 85.**

- El tiempo de realización de este ejercicio es de **105 minutos.**
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «Hoja de Examen» es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y sólo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.
- Una vez concluida la prueba, los aspirantes podrán separar y llevarse la última copia de la «Hoja de Examen». Extreme el cuidado para arrancar únicamente esa última copia.

- SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA «HOJA DE EXAMEN» LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.
- ESTE CUESTIONARIO NO DEBERÁ SER DEVUELTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



Examen Oposición Matronas. SALUD 21 de junio de 2009

- 1) Qué hormona da mayor movilidad a las articulaciones del canal del parto:
 - a) Relaxina
 - b) Estrógenos
 - c) Progesterona
 - d) Ninguna de las anteriores

- 2) El diafragma urogenital se encuentra en:
 - a) En el plano superficial
 - b) En el plano profundo
 - c) En el plano medio
 - d) Ninguno de los anteriores

- 3) El diámetro submentobregmático de la cabeza fetal mide:
 - a) 9,5 cm
 - b) 11 cm.
 - c) 12 cm
 - d) Ninguno de los anteriores

- 4) El aumento en la intensidad de la contracción uterina se denomina:
 - a) Hipertonía
 - b) Hipersistolia
 - c) Taquisistolia
 - d) Polisistolia

- 5) Durante los primeros días del embrión, ¿qué cambio aparece durante la gastrulación?:
 - a) Aparece la notocorda
 - b) Aparece la línea primitiva
 - c) Aparece el tubo neural
 - d) Aparecen las vellosidades coriales

- 6) ¿Cual de las modificaciones vasculares postnatales es correcta?:
 - a) Aparece el divertículo de Meckel
 - b) El cayado aórtico persistente
 - c) Desarrollo del conducto venoso
 - d) Obliteración del conducto arterioso

7) Las fases del duelo son por orden:

- a) Depresión-negación-rechazo-superación
- b) Negación-ira-depresión-resolución
- c) Rechazo-depresión-ira-curación
- d) Ninguna de las anteriores

8) Con el movimiento de contranutación de la pelvis:

- a) Se amplía el estrecho inferior
- b) Se amplía el estrecho superior
- c) Disminuye el estrecho medio
- d) La pelvis no posee movimientos

9) En el parto de nalgas:

- a) Tiene que hacer una rotación externa de 60° para acomodar la cabeza al estrecho inferior
- b) La cabeza fetal debe estar en totalmente deflexionada
- c) Las nalgas bajan haciendo una rotación interna
- d) Todas las anteriores son falsas

10) En la postmenopausia, el estrógeno se libera en forma de:

- a) Estradiol
- b) Andróstenodiona
- c) Estriol
- d) Estrona

11) El diagnóstico de confirmación de la diabetes gestacional se realiza mediante:

- a) Valoración de hemoglobina glicosilada
- b) Test O'Sullivan entre las 24 y 27 semana de gestación
- c) Test de tolerancia oral a la glucosa
- d) b y c son correctas

12) La cartilla maternal es un documento que sirve para:

- a) Recordar la última visita al ginecólogo
- b) Llevar el control de la serología
- c) Para dar a conocer al médico que ha llevado el embarazo
- d) Establecer una comunicación entre los distintos niveles asistenciales

- 13) El mecanismo por el cual el calor se pierde desde la piel del neonato hasta el aire en movimiento se denomina:
- a) Radiación
 - b) Evaporación
 - c) Conducción
 - d) Convención
- 14) En el periodo de dilatación, además del seguimiento y valoración materno-fetales, la matrona debe prestar los siguientes cuidados:
- a) Sólo realizar el seguimiento y valoración materno-fetales
 - b) Intentar abreviar el tiempo de dilatación y expulsivo
 - c) Además de las actividades protocolizadas valorará las necesidades individuales, hidratación, seguridad y apoyo emocional a la madre
 - d) Seguir el protocolo y dejar el apoyo psicológico y emocional para la pareja
- 15) Se ha demostrado la importancia de las prostaglandinas (PG) en el comienzo de las contracciones uterinas, los lugares de producción de la misma se encuentran en:
- a) En el ácido araquidónico
 - b) En los lisosomas celulares
 - c) En el líquido amniótico
 - d) Las membranas fetales
- 16) Ante una paciente embarazada con diagnóstico de CIN II, la conducta será:
- a) Quimioterapia
 - b) Radiación durante seis semanas
 - c) Control citológico y colposcópico cada doce semanas hasta finalizar la gestación
 - d) Histerectomía
- 17) Según la Ley 6/2002 de Salud de Aragón, "El titular de derecho a la información clínica" es:
- a) El profesional sanitario.
 - b) El paciente.
 - c) El paciente y la familia
 - d) El paciente y personas allegadas
- 18) El grado en que un indicador es capaz de identificar todos aquellos casos en que existe un problema real de calidad es atributo de:
- a) Validez
 - b) Sensibilidad
 - c) Efectividad
 - d) Especificidad

19) Los signos clínicos del pólipo mucoso endocervical pueden ser:

- a) Dismenorrea intensa
- b) Infección vaginal de repetición
- c) Exploración dolorosa
- d) Metrorragia de escasa intensidad y/o leucorrea

20) ¿Cuál es la valvulopatía que más frecuentemente puede asociarse a la gestante?

- a) Estenosis mitral
- b) Estenosis aórtica
- c) Estenosis pulmonar
- d) Insuficiencia mitral

21) En el caso de una seroconversión por toxoplasmosis durante la gestación, se recomienda iniciar tratamiento con:

- a) Penicilina
- b) Ampicilina más gentamicina
- c) Espiramicina
- d) Acido clavulánico más amoxicilina

22) El perineo del aparato genital femenino:

- a) Es un músculo abdominal
- b) Está formado por los músculos de los diafragmas pélvico y urogenital
- c) Es el músculo más importante en el parto
- d) Es un diafragma peritoneal

23) ¿Cuál de las siguientes NO es una ventaja de trabajar con un modelo de enfermería?

- a) La valoración se hace a partir de los signos y síntomas
- b) La atención prestada es integral
- c) Permite llevar a cabo todo el proceso de atención de enfermería
- d) Ninguna es correcta

24) ¿Cuántas microgotas equivalen a un mililitro?

- a) 20
- b) 40
- c) 60
- d) 80

25) La posición anatómica es la:

- a) Posición de Fowler
- b) Posición de decúbito lateral izquierda
- c) Posición de decúbito dorsal
- d) Posición decúbito lateral derecho

- 26) ¿Cuál de las siguientes es una característica de los diagnósticos de Enfermería?
- a) Consideran a la persona como un ser biológico
 - b) Desarrolla una teoría que se compara con la fase de ejecución
 - c) No solo depende de los conocimientos científicos y de la habilidad de los enfermos
 - d) Todas son correctas
- 27) Para elaborar un programa de Educación para la Salud es necesario:
- a) Establecer un calendario de actuaciones
 - b) Conocer el contexto social donde se quiere aplicar
 - c) Determinar los recursos
 - d) Todas son correctas
- 28) Entre los parámetros del test de Velasco NO se encuentra:
- a) Sufrimiento fetal
 - b) Tono muscular
 - c) Color en la piel
 - d) Son correctas las opciones b y c
- 29) Si un recién nacido presenta una puntuación de 5 en el Test de Apgar, su estado general es:
- a) De dificultad severa
 - b) De dificultad grave
 - c) No hay dificultad
 - d) De dificultad moderada
- 30) La parte funcional de los ovarios es:
- a) La túnica albugínea
 - b) La médula
 - c) La corteza
 - d) La capa mucosa
- 31) ¿Cuál de estos factores está relacionado con el adelanto de la menopausia?
- a) La edad de la menarquía
 - b) El patrón menstrual
 - c) La obesidad
 - d) El tabaquismo

32) Los cambios más importantes en el mecanismo de la coagulación en el embarazo son:

- a) Disminución de la coagulabilidad
- b) Disminución del sistema fibrinolítico
- c) Disminución de la agregabilidad plaquetaria
- d) Ninguna de las anteriores

33) La estimulación parasimpática:

- a) Disminuye la frecuencia cardíaca
- b) Aumenta la actividad del nódulo senoauricular
- c) Aumenta la actividad del nódulo auriculoventricular
- d) Produce taquicardia refleja

34) La anemia drepanocítica es un trastorno grave y hereditario que se caracteriza porque los eritrocitos:

- a) Son anormalmente grandes
- b) Son muy pequeños
- c) Adquieren consistencia rígida y forma de hoz
- d) Se producen en menor cantidad como consecuencia de la disminución de células madres medulare

35) El concepto clínico de duración de la gestación se conoce como el periodo en el que la mortalidad perinatal es mínima, de acuerdo con este criterio se considera parto a término aquél que tiene lugar:

- a) Entre las 35 y 40 semanas de gestación
- b) Entre las 37 y 44 semanas
- c) Entre las 38 y 42 semanas
- d) Entre las 37 y 44 semanas

36) Para garantizar el éxito de la lactancia materna, deben llevarse a cabo las siguientes medidas EXCEPTO:

- a) Ofrecer suplementos, sólo si se observa que el lactante se queda con hambre después de las tomas
- b) Poner al recién nacido al pecho después del parto lo antes posible
- c) Fomentar la lactancia a demanda del niño sin establecer horarios
- d) No limitar la duración de la mamada

37) Los procesos adaptativos que aparecen en las diferentes etapas de desarrollo de la persona son, según Kendall:

- a) Fisiológicos, cognitivos, conductuales y emocionales
- b) Fisiológicos, psicológicos, sociales y espirituales
- c) Biológicos, psicológicos y sociales
- d) Culturales

- 38) La Administración de ácido fólico, para la prevención de los defectos del tubo neural, debe darse a:
- a) Todas las mujeres con deseo de gestación, 0,4 mg/día periconcepcional, desde un mes antes de la gestación y hasta las 12 semanas de gestación
 - b) Todas las mujeres con deseo de gestación, 0,2 mg/día, desde un mes antes de la gestación y hasta las 12 semanas de gestación
 - c) Todas las mujeres con deseo de gestación, 0,6 mg/día desde un mes antes de la gestación y hasta las 8 semanas de gestación.
 - d) a, b y c son falsas.
- 39) Señale de las anomalías cromosómicas siguientes cual NO es una trisomía:
- a) Síndrome de Down
 - b) Síndrome de Patau
 - c) Síndrome de Turner
 - d) Síndrome de Edwards
- 40) La Ley General de Sanidad, se hizo pública en:
- a) Abril de 1986
 - b) Abril de 1968
 - c) Abril de 1976
 - d) Abril de 1996
- 41) El mecanismo de acción de la anticoncepción hormonal es:
- a) La regularización del ciclo con la producción de niveles altos de hormonas
 - b) La liberación de levonogestrel.
 - c) La inhibición de la secreción de la hormona luteinizante y de la hormona folículo estimulante
 - d) El aumento del estradiol y la progesterona
- 42) El origen del sistema nervioso central, proviene principalmente de:
- a) El ectodermo
 - b) El endodermo
 - c) El mesodermo
 - d) Todas las respuestas anteriores son falsas
- 43) La placenta permite el paso entre la madre y el feto:
- a) De inmunoglobulinas IgG al feto
 - b) Permite el paso de toda clase de inmunoglobulinas de la madre al feto
 - c) No permite el paso de las inmunoglobulinas al feto
 - d) Permite el paso al feto de las inmunoglobulinas excepto las IgG

44) Entre las causas más frecuentes que producen o se asocian a dismenorrea primaria son:

- a) Endometriosis
- b) Adenomiosis
- c) Estenosis cervicales
- d) Ninguna de las anteriores es cierta

45) Señala de las siguientes, que hormonas hipofisarias están elevadas en el climaterio:

- a) FSH y LH
- b) Gn-RH
- c) GH-RH
- d) a y b son correctas

46) La infección por sífilis está producida por:

- a) Treponema pallidum
- b) Bacillus crasus
- c) Haemophilus vaginalis
- d) Trichomonas vaginalis

47) Durante la formación del aparato genital femenino, cual de los siguientes cambios ocurre:

- a) El conducto de Wolf se desarrolla y el de Müller desaparece
- b) El conducto de Müller se desarrolla y el de Wolf degenera
- c) a y b son ciertas
- d) Ninguna es cierta

48)Cuál de los siguientes métodos de educación sanitaria NO es unidireccional?

- a) Carteles
- b) Anuncio de televisión
- c) Entrevista personal
- d) Prensa

49) En una exploración cérvico-vaginal con espéculo no se visualizan los hilos del DIU que la paciente refiere ser portadora, ¿cuál sería la actuación correcta?

- a) No le diría nada a la paciente para no preocuparla
- b) Le explicaría a la paciente que aunque no se visualicen los hilos no es necesario realizar ninguna exploración complementaria
- c) Realizar un cultivo vaginal
- d) Derivar al ginecólogo

50) Respecto a la implantación, que es correcto:

- a) Tiene lugar al 6°-7° después de la ovulación
- b) El huevo se implanta en estado de mórula
- c) El huevo se implanta en estado de blastocisto
- d) a y c son correctas

51) Cuál de los siguientes será un consejo adecuado ante una gestante con ausencia de inmunidad frente a la toxoplasmosis:

- a) No comer carne fresca cruda
- b) Evitar el contacto con gatos
- c) Lavar frutas y verduras exhaustivamente si las consume frescas
- d) Todas las anteriores son correctas

52) El signo de Chadwick consiste en:

- a) Aumento del tamaño uterino.
- b) Elasticidad del istmo uterino.
- c) Asimetría uterina.
- d) Coloración azulada de vagina y cuello

53) Cuál de las siguientes actividades estaría contraindicada en caso de placenta previa:

- a) Exploración con espéculo
- b) Tacto vaginal
- c) Control de la frecuencia fetal
- d) Control de la dinámica uterina

54) Cuál es la localización más frecuente de embarazo ectópico

- a) El cervix
- b) El ovario
- c) La porción intersticial de la trompa de Falopio
- d) La porción ampular e ístmica de la trompa de Falopio

55) Respecto a la situación fetal, es cierto que:

- a) Puede ser longitudinal, transversa u oblicua
- b) Puede ser dorso derecha o dorso izquierda
- c) Puede ser podálica o cefálica
- d) Es la relación de las distintas partes del cuerpo del feto entre si

56) Podremos hacer un diagnóstico de taquisistolia cuando en el trabajo de parto se produce una hiperdinamia de:

- a) Más de 5 contracciones en 10 minutos
- b) Contracciones de más de 60 mmHg de intensidad
- c) Tono basal superior a 12 mmHg
- d) Menos de 3 contracciones en 10 minutos

57) Que criterios debe cumplir una gestante para poder considerar que está en fase activa de parto:

- a) Dinámica uterina regular
- b) Borramiento cervical de al menos el 50%
- c) Dilatación de 3-4cm
- d) Todos los anteriores son correctos

58) Si una gestante a término en fase de expulsivo se encuentra con bolsa rota, salida de líquido amniótico claro y con analgesia epidural, se considerará expulsivo prolongado:

- a) A partir de 3 horas del comienzo del periodo expulsivo en la nulípara
- b) A partir de 1 hora del comienzo del periodo expulsivo en la nulípara
- c) A partir de 2 horas del comienzo del periodo expulsivo en la nulípara
- d) A partir de 30 minutos del comienzo del periodo expulsivo en la nulípara

59) En la actividad asistencial que presta la matrona dentro de los programas y protocolos establecidos por el Sistema de Salud de Aragón, cuál de las siguientes modalidades NO está incluida:

- a) Consulta telefónica
- b) Consulta a demanda, por iniciativa del paciente, preferentemente organizada a través de cita previa
- c) Consulta domiciliaria, que podrá ser a demanda o concertada
- d) Educación para la salud y promoción de la salud en centros educativos

60)Cuál de las siguientes es la causa más frecuente de hemorragia posparto precoz:

- a) La atonía uterina
- b) El acretismo placentario
- c) El desgarro en canal blando del parto
- d) La rotura uterina

61) De las siguientes vacunas virales señala cuál lleva virus inactivados

- a) Varicela
- b) Hepatitis B
- c) Sarampión
- d) Parotiditis

- 62) Qué factor de riesgo iatrogénico está asociado con la inversión uterina puerperal:
- a) Cordón umbilical corto
 - b) Placenta previa
 - c) Trabajo de parto prolongado con hipotonía secundaria
 - d) Maniobra de Credé
- 63) Tras obtener un valor de pH en sangre fetal de 7,26 mediante obtención de sangre fetal a través de cuero cabelludo en el proceso de dilatación de una primigesta, nuestra actitud sería:
- a) Valorar que es una acidosis grave fetal y realizar una cesárea urgente
 - b) Considerar que es una acidosis leve y repetir la toma en 20 minutos
 - c) Considerarlo como valor normal
 - d) Ninguna de las anteriores es correcta
- 64) El derecho de los españoles a la Seguridad Social, está establecido en la Constitución en su:
- a) Artículo 1
 - b) Artículo 41
 - c) Disposición adicional primera
 - d) Artículo 43
- 65) La mastitis puerperal está producida con mayor frecuencia por:
- a) Escherichia coli
 - b) Staphylococcus aureus
 - c) Streptococo agalactiae
 - d) Haemophilus vaginalis
- 66) Ante puérpera a la que se le ha realizado una cesárea y cursa con fiebre a las 36 horas de realizársela, dolor hipogástrico, hipersensibilidad uterina y loquios malolientes; hemos de pensar en una posible:
- a) Infección de la herida quirúrgica de la cesárea
 - b) Mastitis
 - c) Endometritis
 - d) Ninguna de las anteriores es correcta
- 67) Ante una gestante de 33 años con herida inciso-contusa producida por un elemento metálico y no vacunada correctamente del tétanos, realizaremos:
- a) Profilaxis antitetánica con 0,5 ml de toxoide tetánico
 - b) Profilaxis antitetánica con 250-500 U de inmunoglobulina sérica IM y 0,5 ml de toxoide tetánico
 - c) En la gestación está contraindicada la profilaxis antitetánica
 - d) Ninguna de las anteriores

68) El entrenamiento autógeno de Schultz se basa en:

- a) Posiciones que producen estiramientos mantenidos
- b) Obtener el control con la respiración de emergencia
- c) Sensación de pesadez y calor asociada a la relajación muscular y vasodilatación
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

69) En la profilaxis de la enfermedad hemorrágica del recién nacido la conducta clásica es:

- a) La administración por vía oral de 1 mg de vitamina K en las primeras horas de vida
- b) La administración de 1 mg de vitamina K por vía intramuscular en las primeras horas de vida
- c) No se administra la vitamina K por vía IM
- d) a y b son correctas

70) Un R.N. cuyo peso está por debajo del percentil 10 en las curvas de crecimiento intrauterino, se denominará:

- a) Recién nacido de bajo peso
- b) Recién nacido pretérmino
- c) Recién nacido de bajo peso para su edad gestacional
- d) Recién nacido con retraso de crecimiento intrauterino

71) Señala en qué circunstancia está contraindicada la lactancia materna:

- a) Madre portadora de hepatitis B
- b) Ictericia por incompatibilidad Rh
- c) Niño con galactosemia
- d) Madre diabética

72) ¿Qué determinación se realiza al recién nacido en las primeras 48 horas de vida mediante punción en el talón?

- a) Determinación de la fenilcetonuria
- b) Determinación del hipotiroidismo congénito
- c) Determinación de la glucosa capilar
- d) Determinación de la hiperfenilalaninemia

73) De las siguientes descripciones cuál NO corresponde a una ictericia no fisiológica:

- a) Tasas de bilirrubina total superiores a 12,9 mg/dl en recién nacido a término
- b) Aumento diario de bilirrubina superior a 5 mg/dl
- c) Aparición del síndrome icterico tras 48 horas de vida
- d) Aparición del síndrome icterico en las primeras 24 horas de vida

74) Puérpera que tras 10 días de un parto eutócico acude a la consulta con recién nacido que ha comenzado con rechazo al alimento, succión y llanto débiles, letargia e hipotonía, cuál sería la actuación adecuada:

- a) La tranquilizaríamos recordándole que los recién nacidos pasan muchas horas del día durmiendo y con poca actividad
- b) La derivaríamos al pediatra para ser valorado ese mismo día
- c) Le recomendaríamos que despertase al recién nacido tras 3 horas de ayuno para realizar una ingesta
- d) Derivarla al servicio de admisión para ser citada para realizar la revisión del recién nacido a los 15 días de vida

75) El personal que accede a los datos de la Historia Clínica en el ejercicio de sus funciones queda sujeto al deber de:

- a) Discrecionalidad
- b) Secreto
- c) Custodia de datos personales
- d) No divulgación de Información

76) En un parto en el que el recién nacido presenta un mielomeningocele, nuestra primera actuación será:

- a) Exploración neurológica para diagnosticar grado de afectación
- b) Intentar reducirlo
- c) Aplicar yodo con gasas estériles en la zona afectada
- d) Cubrir la lesión con un apósito húmedo y estéril para evitar su rotura y posterior infección

77) En qué enfermedades de las siguientes se recomienda la administración simultánea de anticuerpos (en forma de inmunoglobulinas) y vacuna como profilaxis postexposición en niños:

- a) Hepatitis B
- b) La rabia
- c) El tétanos
- d) Todas las anteriores son correctas

78) Al realizarle la valoración ginecológica a una mujer adulta, ésta le refiere que sangra entre los periodos menstruales. Este dato lo registra como:

- a) Menorragia
- b) Metrorragia
- c) Amenorrea
- d) Polimenorrea

79) Señale cuál de las siguientes afirmaciones sobre la transmisión del VIH, NO es correcta:

- a) La práctica con mayor riesgo es el sexo anal sin protección
- b) El riesgo de infección es mayor para la pareja que recibe el semen
- c) El coito durante la menstruación aumenta el riesgo de transmisión
- d) La presencia de lesiones genitales causadas por otras enfermedades de transmisión sexual no incrementa la probabilidad de infección

80) Todas las manifestaciones siguientes se asocian con infección del tracto urinario, EXCEPTO:

- a) Polaquiuria
- b) Urgencia para la micción
- c) Disuria
- d) Poliuria

81) Isabel Sánchez está embarazada de 8 semanas y quiere saber el estado de desarrollo de su feto. En este momento de la gestación:

- a) El corazón del feto empieza a latir
- b) Se puede ver el sexo del feto
- c) Todos los órganos corporales están formados
- d) Se puede escuchar el latido cardíaco con fonendoscopio

82) La acondroplasia (enanismo) es una enfermedad Monogénica de Herencia Mendeliana que se caracteriza por:

- a) Una mutación puntual que cambia el aminoácido uracilo por glicina
- b) Una enfermedad autosómica dominante, esporádica, resultado de una mutación de "novo"
- c) Es un desorden alélico en humanos recesivos
- d) Puede detectarse ecográficamente antes de las 20 semanas de gestación

83) En la muerte fetal, que signo nos da el diagnóstico de certeza radiológico:

- a) Signo de Spalding
- b) Signo Halo
- c) Signo de Robert
- d) No se puede confirmar la muerte fetal radiológicamente

84) Señale la opción FALSA. La toma de muestras ante una agresión sexual:

- a) Nos permite identificar al agresor mediante el ADN
- b) Nos sirve para el diagnóstico de un posible embarazo
- c) No es necesario el consentimiento de la víctima
- d) Nos sirve para el diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual

85) Según la Ley General de Sanidad, el Consejo de Salud del Área es un órgano de:

- a) Gestión
- b) Dirección
- c) Participación
- d) Administración

86) Es una contraindicación absoluta para el uso del diafragma:

- a) Vaginitis no tratada
- b) Infecciones repetidas del tracto urinario
- c) Cistocele o rectocele
- d) Retroversión severa del útero

87) El método de Lamaze se denomina también:

- a) Parto sin dolor
- b) Parto sin temor
- c) Parto con relajación
- d) Todas las anteriores son falsas

88) La tercera maniobra en la palpación abdominal:

- a) Sirve para palpar el fondo uterino y localizar la cabeza fetal
- b) Sirve para ver si ha descendido la presentación y si está flexionada o deflexionada
- c) Sirve para localizar los miembros fetales
- d) Nos confirmará la presentación fetal

89) Una de las complicaciones más frecuentes de la fetoscopia es:

- a) Parto prematuro
- b) Infección ovular
- c) Muerte fetal
- d) Todas son iguales en frecuencia

90) ¿Qué enfermedades detecta el Test de Coombs Indirecto?

- a) El test de Coombs sirve para detectar enfermedades fetales relacionadas con el factor Rh
- b) Ninguna.
- c) El test de Coombs Indirecto tiene riesgo de aborto
- d) Se practica en sangre del bebé. Nos permite saber si la madre ha generado anticuerpos Anti-RH

- 91) La frecuencia cardiaca fetal basal normal, se sitúa entre:
- a) 80-100 latidos por minuto
 - b) 100-120 latidos por minuto
 - c) 120-160 latidos por minuto
 - d) 180-200 latidos por minuto
- 92) Las pruebas del embarazo se basan en el análisis de la orina materna para identificar la existencia de:
- a) Lactógeno placentario humano
 - b) Estrógenos
 - c) Gonadotropina coriónica humana
 - d) Progesterona
- 93) Si un feto está en situación transversa en el útero, la presentación fetal será:
- a) Frontal
 - b) De vértice
 - c) De nalgas
 - d) De hombro
- 94) A una mujer premenopausica, a la que está enseñando a realizar la autoexploración mamaria, le recomendaría como mejor momento para llevarla a cabo:
- a) Catorce días después de terminar el período menstrual
 - b) Durante el período menstrual
 - c) Entre siete y cinco días antes de iniciarse el período menstrual
 - d) Entre el quinto y octavo día del ciclo
- 95) La determinación de alfa-fetoproteína en el suero materno durante el embarazo es útil en la detección prenatal de las anomalías fetales, los niveles elevados en el suero materno se relacionan con:
- a) Malformaciones cardíacas
 - b) Malformaciones óseas
 - c) Malformaciones del tubo neural
 - d) Malformaciones oculares
- 96) Utilizando la regla de Naegele, ¿cuál será la fecha probable de parto de una mujer si el primer día de su última regla fue el 14 de abril?
- a) 7 de enero
 - b) 15 de enero
 - c) 21 de enero
 - d) 27 de enero

97) Las enfermedades autosómicas dominantes:

- a) Se asocian más a herencia materna
- b) La transmiten más los hombres
- c) Se transmiten independientemente del sexo
- d) Ninguna de las anteriores

98) Son requisitos para la obtención del consentimiento informado:

- a) Que se formalice por escrito
- b) Debe estar firmado por el paciente o familiares o tutores o si está incapacitado
- c) Debe contemplar la posibilidad de revocación
- d) Todas las anteriores

99) Cuando se identifica violencia física o psicológica en una mujer al realizar una actuación asistencial deberemos:

- a) Realizar una exploración detallada y valoración psicológica
- b) Aplicar el tratamiento preciso
- c) Realizar un detallado registro en la historia clínica
- d) Todas las anteriores son correctas

100) El secreto profesional se puede romper en las siguientes situaciones:

- a) Cuando mantenerlo pone en peligro la salud o la vida del propio enfermo o la integridad de otros o la salud pública.
- b) Cuando mantenerlo pone en peligro los derechos de terceras personas, la acción de la justicia y el bien común.
- c) a y b son correctas.
- d) Nunca puede romperse

PREGUNTAS DE RESERVA

- 101) Requisitos de un código Deontológico:
- a) Imponer ciertas normas para preservar la integridad de los miembros del colectivo
 - b) Proteger los principios de la Ética profesional que les define y aglutina
 - c) Establecer cuáles han de ser las expectativas de los usuarios con respecto a los servicios que ofrecen los miembros de una determinada profesión
 - d) Todas son correctas
- 102) La legislación española prohíbe a los profesionales sanitarios y a los fabricantes y distribuidores de preparados para lactantes proporcionar a los usuarios:
- a) Objetos promocionales peligrosos para los niños o caducados
 - b) Productos, muestras, ni ningún otro obsequio de promoción, directa o indirectamente a través de los servicios sanitarios o personal sanitario
 - c) Objetos promocionales sin prospecto ni con indicaciones y especificaciones claras para orientar a los padres sobre los beneficios los productos que venden
 - d) Son correctas a y c
- 103) Durante el parto natural se puede reducir el dolor mediante medios de anestesia siempre que exista consentimiento:
- a) De la pareja de la mujer
 - b) De la gestante
 - c) Del médico
 - d) De la matrona
- 104) La mujer embarazada portadora de un feto con malformaciones incompatibles con la vida:
- a) Tiene derecho a seguir con su embarazo
 - b) Tiene derecho a interrumpir el embarazo
 - c) Obligatoriamente debe interrumpir su embarazo
 - d) Las respuestas a y b son correctas
- 105) El diagnóstico de CIN I corresponde a:
- a) Carcinoma in situ.
 - b) Carcinoma de cérvix.
 - c) Metaplasia escamosa
 - d) Displasia leve

- 106) Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos deberemos recomendar para evitar la transmisión del virus del SIDA a través de relaciones sexuales:
- a) Preservativo masculino
 - b) Preservativo femenino
 - c) Las 2 anteriores son correctas
 - d) Todas las anteriores son incorrectas
- 107) ¿Cuál es el plazo de tiempo máximo en el que la píldora postcoital es todavía eficaz?
- a) Hasta las 12 horas postcoito
 - b) Hasta las 24 horas postcoito
 - c) Hasta las 48 horas postcoito
 - d) Hasta las 72 horas postcoito
- 108) Ante una puérpera que en las 4 primeras semanas tras el parto presenta tristeza, llanto, pérdida de libido, miedo sin motivo, apatía hacia el bebé y sus cuidados que generan sentimiento de culpa; podremos hacer un diagnóstico de:
- a) Labilidad puerperal
 - b) Depresión posparto
 - c) Psicosis puerperal
 - d) Ninguna de las anteriores es cierta
- 109) Una paciente colocada boca abajo, apoyada sobre su pecho y rodillas se encuentra en posición:
- a) Decúbito prono
 - b) Ortostática
 - c) Genupectoral
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
- 110) Las gotas oculares deben ponerse en
- a) El centro del saco conjuntival
 - b) El centro del globo ocular
 - c) El ángulo interno del ojo
 - d) El ángulo externo del ojo

ESTA PÁGINA ESTÁ EN BLANCO INTENCIONADAMENTE

