

**PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL
ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS DE MATRONAS DEL SERVICIO DE SALUD
DE CASTILLA Y LEÓN (ORDEN/SAN/947/2008 de 29 de MAYO).**

PRIMER EJERCICIO

ADVERTENCIAS:

1. ESTA PROHIBIDA LA UTILIZACIÓN DE TELEFONOS MÓVILES Y EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN.
2. NO ABRA ESTE CUESTIONARIO HASTA QUE SE LE INDIQUE.
3. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la "HOJA DE RESPUESTAS"
4. Compruebe siempre que el número de respuestas que señale en la "HOJA DE RESPUESTAS" es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
5. Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador y llevarse al finalizar el ejercicio.
6. Sólo existe una respuesta correcta por pregunta. Todas las preguntas tienen el mismo valor.
7. ESTE CUESTIONARIO CONSTA DE 99 PREGUNTAS, DE LAS CUALES LAS 9 ÚLTIMAS SON DE RESERVA PARA POSIBLES ANULACIONES. En el caso de anulación de preguntas, las de reserva se irán utilizando por el orden en el que figuran en el cuestionario (de la 91 en adelante).
8. Las contestaciones erróneas se penalizarán con un tercio del valor de la respuesta correcta. No tendrán la consideración de erróneas las preguntas no contestadas.
9. SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA "HOJA DE RESPUESTAS" LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.
10. AL FINALIZAR EL EJERCICIO ES OBLIGATORIO ENTREGAR LA "HOJA DE RESPUESTAS".

CUESTIONARIO

1.- El Gerente Regional de Salud tiene rango de:

- a) Viceconsejero.
- b) Director General. ←
- c) Secretario General. —
- d) Secretario Técnico.

2.- La Presidencia del Consejo de Administración de la Gerencia Regional de Salud corresponde a:

- a) El Gerente Regional de Salud.
- b) El Consejero de Sanidad.
- c) El Presidente de la Junta de Castilla y León.
- d) El Secretario General de la Consejería de Sanidad.

3.- La Dirección General de Asistencia Sanitaria de la Gerencia Regional de Salud, se estructura en las siguientes Direcciones Técnicas:

- a) Atención Primaria y Atención Especializada. ~
- b) Asistencia Sanitaria y Farmacia.
- c) Asistencia Sanitaria e Inspección.
- d) Atención Primaria, Atención Especializada y Farmacia. —

4.- Los Hospitales de la Junta de Castilla y León se clasifican en los siguientes grupos:

- a) Grupos 1, 2, 3.
- b) Grupos 1, 2, 3, 4, 5.
- c) Grupos 1, 2, 3, 4.
- d) Grupos 1, 2.

5.- La Ley 4411993, de 21 de noviembre, de Ordenación de las profesiones sanitarias establece:

- a)- Los técnicos superiores y técnicos del Área Sanitaria de formación profesional ejercen su actividad de acuerdo con las normas reguladoras de la formación profesional, ~
- b) Los profesionales y los responsables de los centros sanitarios facilitarán a sus pacientes el derecho a conocer el nombre, la titulación y la especialidad de los profesionales que les atienden.
- c) Los Colegios Profesionales, Consejos Autonómicos y Consejos Generales en sus respectivos ámbitos territoriales establecerán los registros públicos de profesionales, que serán accesibles a la población.
- d) Todas las anteriores.

6.- Según la Ley del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, atendiendo al nivel académico del título exigido para el ingreso, el personal estatutario se clasifica:

- a) Personal Estatutario Sanitario y Personal Estatutario de Gestión y Servicios.
- b) Personal Estatutario Facultativo y Personal Estatutario no Sanitario.
- c) Personal Estatutario y Personal Laboral.
- d) Personal de formación Universitaria y Técnicos.-

7.- El II Plan contra la Violencia de Género en Castilla y León (2007-20011) regula una de las siguientes medidas:

- a) La atención sanitaria en otra provincia distinta a la de la agresión.
- b) Una dotación económica a las víctimas, excepto extranjeras.
- c) Incluir la atención sanitaria a la violencia de género en la cartera de servicios del Sistema de Salud de Castilla y León. -
- d) Una desgravación fiscal por violencia de género.

8.- Señale que dos principios de la Bioética tienen prioridad frente al resto.

- a) El de autonomía y el de beneficencia.
- b) El de no maleficencia y el de justicia. -
- c) El de no maleficencia y el de autonomía.
- d) El de autonomía y el de justicia.

9.- La respuesta alérgica al latex:


- a) Es una clasificación diagnóstica del código CIE-9 -
- b) Es un Diagnóstico Enfermero de la clasificación NANDA. -
- c) Las dos anteriores son correctas. -
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

10.- La calidad del Sistema Nacional de Salud:

- a) Se mide por la norma ISO-excel.
- b) Evalúa sólo al personal facultativo.
- c) Es un proceso de mejora permanente. -
- d) a y b son correctas.

11.- La Historia Clínica:

- a) Puede recoger datos del árbol genealógico de la paciente.
- b) Recoge, entre otros, datos de anamnesis, exploración, pruebas complementarias, diagnóstico, pronóstico y tratamiento.
- c) Es un documento confidencial sujeto a secreto profesional, aun siendo compartido.
- d) Todas las anteriores son ciertas. -



12.- Señale la correcta de las siguientes respuestas:

- a) La creación de la Gerencia Regional de la Salud viene establecida en la Ley 1/1993, de 6 de abril, de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León.
- b) El Consejo Regional de Salud está presidido por el Gerente Regional de la Salud.
- c) El Sistema Sanitario de Castilla y León se ordena en demarcaciones denominadas Zonas Básicas de Salud.
- d) Todas las anteriores son correctas.

13.- Indique cual de las siguientes respuestas es correcta:

- a) El acceso a la historia clínica con fines de investigación obliga a preservar los datos de identificación personal del paciente, separados de los de carácter clínico-asistencial, salvo que el propio paciente haya dado su consentimiento para no separarlos.
- b) El personal de administración y gestión de los centros sanitarios no puede acceder a ningún dato de las historias clínicas.
- c) El derecho de acceso del paciente a la historia clínica no puede ejercerse por representación.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

14.- Una de las metas de la OMS es reducir las desigualdades sociales en salud. El término que hace referencia a esta meta es:

- a) Igualdad.
- b) Eficiencia.
- c) Equidad.
- d) Accesibilidad.

15.- En la interrupción voluntaria del embarazo ¿Cuál de los siguientes supuestos es causa de punibilidad?:

- a) Riesgo vital para la madre.
- b) Que no esté clara la paternidad del feto.
- c) Que el feto pueda nacer con graves taras físicas.
- d) Embarazo causado por una violación.

16.- En la primera consulta a la mujer embarazada, quedará registrado:

- a) Valoración del riesgo fetal.
- b) La existencia de signos de insuficiencia venosa en extremidades inferiores.
- c) Examen buco dental.
- d) Todas las anteriores.



17.- Los ejercicios de Kegel son útiles para:

- a) La rehabilitación vascular.
- b) La reeducación perineal. –
- c) La rehabilitación respiratoria.
- d) La rehabilitación cardíaca.

18.- La promoción de la salud es el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla, definido en la Carta de Ottawa:

- a) Ámsterdam, OMS 1986.
- b) Ginebra, OMS 1986.
- c) Londres, OMS 1991.
- d) Praga, OMS 1991.

19.- Para medir la tasa de fecundidad se utiliza la población femenina fértil:

- a) Entre 12 y 55 años.
- b) Entre 15 y 55 años.
- c) Entre 15 y 49 años. –
- d) Entre 12 y 45 años.

20.- Los anovuladores orales están contraindicados:

- a) Por encima de 30 años.
- b) En enfermedad tromboembólica. –
- c) Con quistes simples de ovario.
- d) En enfermedades de transmisión sexual.

21.- La ~~tasa~~ de natalidad mide:

- a) Los nacidos durante un año entre la población media.
- b) Los nacidos vivos durante un año entre la población total media. -
- c) Los nacidos vivos durante un año entre la población femenina fértil.
- d) Los embarazos durante un año entre la población femenina fértil.

22.- Una de las siguientes afirmaciones sobre el folículo de Graaf, es falsa:

- a) Evoluciona hasta convertirse en cuerpo albicans. –
- b) Se distinguen en ~~él~~ tres partes: teca, capa granulosa y antro.
- c) Crece hasta alcanzar un diámetro de 10-20 mm.
- d) Se colapsa y empieza su fase de cuerpo lúteo.



- 23.- El periodo embrionario comprende:
- a) Desde la 1ª semana a la 8ª semana de gestación. -
 - b) Desde la 2ª semana a la 3ª semana de gestación.
 - c) Desde la 4ª semana a la 8ª semana de gestación. -
 - d) Desde la 9ª semana a la 10ª semana de gestación.
- 24.- ¿Cuál de las siguientes características no corresponde a la placenta humana?
- a) La cara fetal deriva del cordón frondoso.
 - b) Puede alcanzar un peso de 600 grs.
 - c) La cara materna deriva de la decidua basal.
 - d) La cara materna presenta en el centro la inserción del cordón umbilical. -
- 25.- El óvulo tiene una vida media de fertilización de:
- a) Unas seis horas.
 - b) Unas doce horas. -
 - c) Unas veinticuatro horas.
 - d) Unas cuarenta y ocho horas.
- 26.- En la anovulación, la inducción de la ovulación se realiza con:
- a) Gonadotropinas.
 - b) Gestágenos. -
 - c) Estrógenos y gestágenos.
 - d) Estrógenos.
- 27.- El test de SIMS-HUHNER sirve para evaluar, en la esterilidad de origen femenino el factor:
- a) Cervical.
 - b) Uterino.
 - c) Tubárico.
 - d) Ovárico.
- 28.- Cuando el conjunto cromosómico no es múltiplo exacto del número haploide, la anomalía se denomina:
- a) Monosomía.
 - b) Trisomía.
 - c) Poliploidía. -
 - d) Aneuploidía. -



29.- Durante la ovulación se expulsa:

- a) El ovocito de primer orden.
- b) El ovocito de segundo orden. -
- c) El Óvulo.
- d) La ovogonia.

30.- El nódulo de Hensen, situado en la línea primitiva del disco embrionario, aparece hacia:

- a) El día 8.
- b) El día 10.
- c) El día 13.
- d) El día 15.

31.- Del endoblasto deriva el:

- a) Cerebro.
- b) Aparato urogenital.
- c) Epitelio respiratorio. -
- d) Aparato cardiovascular.

32.- Los ovarios se desarrollan hacia a semana de gestación:

- a) Decimooctava.
- b) Vigésimocuarta.
- c) Duodécima. -
- d) Octava. -

33.- El nivel de alfa-fetoproteína, medido en el segundo trimestre de gestación, permite detectar:

- a) Anencefalia.
- b) Gastrosquisis.
- c) Espina bífida. -
- d) Todas las anteriores.

34.- El paladar hendido es una enfermedad:

- a) Poligénica. -
- b) Autosómica dominante.
- c) Autosómica recesiva.
- d) Ligada al cromosoma X.



35.- La acondroplasia, forma más común del enanismo, se hereda de forma:

- a) Autosómica dominante. ✓
- b) Poligénica.
- c) Autosómica recesiva. ✓
- d) Ligada al cromosoma X.

36.- La malformación llamada SDR o enfermedad de la membrana hialina, se refiere al:

- a) Sistema arterial.
- b) Sistema venoso.
- c) Aparato respiratorio. ✓
- d) Aparato digestivo.

37.- En el síndrome decúbico hipotensor, además del cambio posicional, el tratamiento adecuado para la gestante será:

- a) Administrar cardiotónicos.
- b) Administrar líquidos. ✓
- c) Inspiraciones profundas. ✓
- d) Todas son correctas.

38.- ¿Cómo se denomina el signo de cambio de color de la mucosa vaginal en la gestación?:

- a) de Hegar.
- b) de Jasquemier-Chadwick. ✓
- c) de Goodell.
- d) De Piscasek.

39.- En el diagnóstico de probabilidad del embarazo, el signo imprescindible es:

- a) La amenorrea durante diez o más días.
- b) El crecimiento uterino. ✓
- c) Los trastornos urinarios.
- d) La alteración de la pigmentación de la piel.

40.- ¿Qué nombre recibe la regla utilizada para el cálculo de la edad gestacional?

- a) Wahl-Berutti
- b) Naegle ✓
- c) Pinard
- d) French-Shark

41.- El riesgo de que un feto de madre seropositiva al SIDA se infecte se estima en:

- a) 20-30%
- b) 60%
- c) 95%
- d) Si la gestante está tratada, 2-5% ■

42.- En relación con la TOXOPLASMOSIS, indique cual es falsa de las siguientes aseveraciones:

- a) La certeza de que el feto se haya contagiado se diagnosticará por funiculocentesis en sangre o estudio de líquido amniótico.
- b) La hidrocefalia, el retraso psicomotor o la hepatoesplenomegalia son patologías asociadas a este proceso.
- c) La dilatación ventricular es patología asociada a este proceso. —
- d) La posibilidad de que el feto resulta afectado disminuye proporcionalmente a la edad gestacional. ■

43.- En un proceso toxicofico, no es usual que se produzca por la dependencia:

- a) Un elevado número de abortos.
- b) Crecimiento retardado del feto.
- c) Prematuridad.
- d) Calcificaciones periventriculares en el feto,

44.- ¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos no se encuentm entre los síntomas relativos a un diagnóstico de aborto diferido'

- a) Tamaño uterino inferior a la edad gestacional.
- b) Cuello uterino abierto.-
- c) Sangrado y dolor escaso o ausente.
- d) Ninguno de los anteriores se encuentra entre los síntomas de aborto diferido.

45.- Ante una hemorragia y/o dolor en el tercer trimestre de gestación debemos sospechar:

- a) Desprendimiento prematuro de la placenta. —
- b) Rotura uterina. —
- c) Cáncer de cervix.
- d) Todas las anteriores.

46.- ¿Cuál de las hormonas que aumentan en el embarazo tiene repercusión directa con la hiperémesis gravídica?

- a) TSH
- b) ACTH
- c) Prolactina. ■
- d) Ninguna de las anteriores.

47.- Se considera buena rehidratación en el tratamiento de la hiperémesis gravídica cuando la diuresis supera:

- a) 1.000 c.c.
- b) 300 c.c.
- c) 500 c.c.
- d) 1.500 c.c.

48.- En la profilaxis de la isoimmunización antenatal ¿En qué casos está indicada la GG anti-D?:

- a) En la semana gestacional 28, en mujer con RH (-).
- b) Después de un cerclaje cervical.
- c) Después de un sangrado uterino y con tres semanas de intervalo de una dosis anterior.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

49.- De los siguientes errores en la valoración de la presión arterial ¿Cuál es la causa de una lectura mas baja de la real que tiene el paciente?:

- a) Brazo por encima del nivel del corazón.
- b) Manguito demasiado estrecho.
- c) Brazo por debajo de la altura del corazón.
- d) Brazo no apoyado.

50.- De acuerdo con la clasificación de Priscilla White, a que grupo pertenece la diabetes mellitus complicada con coronariopatía:

- a) Grupo E
- b) Grupo F
- c) Grupo H
- d) Grupo R

51.- En un proceso de Hidramnios, entre las patologías maternas desencadenantes mas frecuentes se encuentra:

- a) Crecimiento intrauterino retardado.
- b) Postmadurez.
- c) Hipertensión arterial.
- d) Anemia.

52.- La infección inespecífica de la cavidad amniótica, sus anejos y ocasionalmente del feto durante la gestación, se denomina:

- a) Bacteriuria asintomática.
- b) Síndrome infeccioso gestacional inespecífico.
- c) Micoplasmosis.
- d) Corioamnionitis.

53.- En una gestante con amenaza de parto prematuro (GPP) ¿Entre qué semanas esta indicado el tratamiento de maduración pulmonar fetal?:

- a) Entre la semana 16 y 23.
- b) Entre la semana 24 y 34.
- c) Entre la semana 35 y 37.
- d) Entre la semana 35 y 40.

54.- La muerte fetal anteparto ¿Cuál de las siguientes complicaciones maternas puede causar?

- a) Alteración de la coagulación.
- b) Coagulación intravascular diseminada.
- c) Sepsis.
- d) Todas las anteriores son correctas.

55.- Según la FIGO (Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia), para determinar la edad gestacional, el primer día de la última regla normal se considera:

- a) Día 0.
- b) Día 1.
- c) Los días 0-6 son la semana 0.
- d) Las opciones a y c son correctas.

56.- ¿Cuál de estos síntomas o signos no corresponde a la preeclampsia grave?:

- a) Proteinuria mayor que 5 grs/24 horas.
- b) Oliguria menor o igual que 400 ml/24 h.
- c) Ganancia ponderal mayor que 5 Kgr.
- d) Hipertensión superior a 160/110 mm Hg.

57.- Según la teoría de Friedberg, ¿Cuándo se considera de mal pronóstico la ictericia grave del recién nacido en relación con la Hb de este?:

- a) Hb entre 12-15 gr. %.
- b) Hb entre 8-10 gr. %
- c) Hb entre 10-12 gr. %
- d) Hb menor de 8 gr. %.

58.- Una temperatura corporal de 38° en una mujer en las 24 horas inmediatas al parto, indica:

- a) Una reacción normal a los efectos del parto. -
- b) Infección puerperal.
- c) Deshidratación grave.
- d) Sepsis.

59.- En la presentación cefálica, modalidad bregma ¿Cuál es el diámetro del encajamiento al estrecho superior?:

- a) Submentobregmático de 9,5 cm.
- b) Suboccipito frontal de 10,5 cm.
- c) Occipito frontal de 12 cm. -
- d) Sincipito mentoniano de 13,5 cm.

60.- Acmé de contracción es:

- a) El grado de tensión muscular del útero entre contracción.
- b) El momento de máximo aumento de la presión intrauterina. -
- c) El momento en que la contracción se hace dolorosa.
- d) El tiempo durante el que la paciente percibe la inducción.

61.- Entre las contraindicaciones absolutas para la inducción terapéutica del parto, se encuentra:

- a) El crecimiento intrauterino retardado.
- b) La muerte legal.
- c) El procúbito del cordón umbilical. -
- d) La enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

62.- ¿A qué se deben las "espigas" en las variaciones de la frecuencia cardíaca fetal durante el parto?:

- a) A un brusco aumento del tono vagal.
- b) Son producidas por las contracciones.
- c) Se asocian con hipoxia y acidosis fetal.
- d) Se asocian con la depresión del feto.

63.- En el estrecho inferior ¿Qué pelvis presenta todos sus diámetros redondos?:

- a) Plana anillada.
- b) Infundibuliforme.
- c) de Roberts.
- d) Ginecoide. -

64.- En la pelvis antropoide ¿Cuál es el diámetro más grande del estrecho superior?

- a) El transverso.
- b) El conjugado diagonal.
- c) El oblicuo.
- d) El anteroposterior. ➔

65. El índice de gemelidad es mayor en:

- a) La raza blanca.
- b) La raza negra. ➔
- c) La raza asiática.
- d) No influye la raza.

66.- Durante el trabajo del parto ¿Cuál de los siguientes signos indican la inminencia de rotura uterina producida por una desproporción pélvico-fetal?:

- a) Pinar.
- b) Chaussier.
- c) Bandel-Frommel.
- d) Goodell.

67.- La anestesia epidural produce en la madre:

- a) Taquicardia.
- b) Hipertensión.
- c) Hipertonía.
- d) Vasodilatación. ➔

68.- ¿Cuál es el punto guía en la presentación de la cara?:

- a) La fontanela posterior.
- b) El ángulo anterior del bregma.
- c) Los orificios nasales.
- d) La glabella.

69.- En las distocias de partes blandas indique cual de las siguientes es una causa intrínseca:

- a) Hemiutero previo.
- b) Fibroma uterino.
- c) Fecalomas. -
- d) Tumores de ovario.



70.- ¿Qué condiciones tiene el cuello uterino de cara a un parto inducido con una puntuación del test de Bishop de 4?:

- a) Malas condiciones. —
- b) Buenas condiciones.
- c) Condiciones moderadamente buenas. ↗
- d) Con esta puntuación no es necesario inducir.

71.- En el sufrimiento fetal:

- a) Existe una redistribución de flujo, siendo los órganos favorecidos el cerebro, el corazón y el intestino.
- b) Los quimiorreceptores detectan una disminución de la pO_2 que activa el centro cardioregulador. ↘
- c) La medula suprarrenal no se activa.
- d) Todas las anteriores son falsas. ~

72.- El prolapso de cordón esta favorecido en todas las situaciones que:

- a) Hay buena adaptación fetal al estrecho superior de la pelvis.
- b) No hay buena adaptación fetal al estrecho superior de la pelvis. -
- c) Hay buena adaptación fetal al estrecho inferior de la pelvis.
- d) Hay buena adaptación fetal al ancho superior de la pelvis.

73.- El embolismo de líquido amniótico puede ocurrir:

- a) Tras una aminiocentesis.
- b) Durante el parto.
- c) Tras el parto.
- d) Todas las respuestas son verdaderas. =

74.- En una puerpera que ha padecido durante el parto una eclampsia ¿Qué fármacos estarán contraindicados?:

- a) Oxitocina.
- b) Methergin =
- c) Higraliána.
- d) Ninguno de los anteriores.

75.- Dentro de la clasificación de fórceps curvos no encontramos:

- a) F. de Simpson.
- b) F. de Piper.
- c) F. de Naegele.
- d) F. de Zweifel. ~

76.- Cuando en un parto, el ginecólogo realiza una "ventosa", la matrona estará atenta para cesar la aspiración cuando:

- a) La cazoleta se deslice accidentalmente durante la tracción.
- b) La cabeza haya sido expulsada.
- c) Los hombros hayan sido expulsados.
- d) a y b son correctas.

77.- La ventilación alveolar en el recién nacido es:

- a) Igual a la del adulto.
- b) Dos a tres veces la del adulto.
- c) Cuatro a cinco veces la del adulto.
- d) Inferior a la del adulto.

78.- ¿A que denomina efluvio felógeno postparto?:

- a) Erupción cutánea intensamente pruriginosa.
- b) Tumores cutáneos pigmentados.
- c) Caída del pelo, hacia uno-dos meses después del parto.
- d) Depósitos de melanina en los macrófagos de la dermis.

79.- La ligadura precoz del cordón umbilical en un recién nacido con anoxia grave ¿en qué plazo de tiempo debe hacerse?:

- a) En menos de 15 segundos.
- b) Entre 30-60 segundos.
- c) Entre 20-30 segundos.
- d) Entre 60-120 segundos.

80.- Si un neonato al nacer presenta una dificultad respiratoria moderada que no responde a la ventilación mecánica ¿Qué se debe descartar en primer lugar?

- a) Posición incorrecta de la mascarilla.
- b) Hipovolemia.
- c) Enfermedad de membrana hialina.
- d) Neurnotorax.

81.- Cuando la madre sea enferma o portadora de VHB ¿Qué dosis debe suministrarse al recién nacido de gammaglobulina antiB por vía intramuxular?:

- a) 0,20 c.c.
- b) 0,50 c.c.
- c) 0,10 c.c.
- d) 1 c.c.

82.- ¿Cuál de los siguientes signos no suele aparecer en la policitemia del RN?

- a) Cianosis.
- b) Hipotonía.
- c) Hiperglucemia.
- d) Plétora.

83.- En el Kernicterus, la bilirrubina:

- a) ~~Está~~ elevada en sangre. ~
- b) Mantiene cifras normales.
- c) Está disminuida.
- d) El trastorno no guarda relación con la bilirrubina.

84.- Tras un parto vaginal, el hematoma que más frecuentemente aparece es:

- a) Vulvar.
- b) Vaginal.
- c) Vulvovaginal.
- d) Subperitoneal.

85.- ¿Qué porcentaje de mujeres padecerá cáncer de mama a lo largo de su vida?

- a) 2%.
- b) 15%. -
- c) 30%.
- d) 7%. -

86.- Los entuertos normalmente desaparecen:

- a) Entre 1-3 días postparto.
- b) Entre 4-7 días postparto.
- c) Entre 8-10 días postparto. ~
- d) Entre 10-15 días postparto.

87.- El masaje perineal con aceite de rosa de mosqueta:

- a) Está contraindicado en el puerperio.
- b) Está contraindicado si ~~se~~ ha realizado episiotomía. ~
- c) Está contraindicado en multíparas.
- d) No está contraindicado.

88.- El signo de Homans sirve para diagnosticar:

- a) Trombosis venosa profunda. ✓
- b) Salpingitis.
- c) Absceso mamario.
- d) Hemorragia postparto precoz.

89.- Aumenta el riesgo de padecer cáncer de endometrio:

- a) La diabetes mellitus.
- b) La hipertensión.
- c) El tratamiento con anticoagulantes.
- d) La enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

90.- ¿Qué característica no tiene el chancro sifilítico?:

- a) Forma redondeada u oval.
- b) Consistencia cartilaginosa.
- c) Úlcera dolorosa. ✓
- d) Color rojo oscuro.

91.- ¿Cuál de los siguientes no es sistema de selección del personal estatutario fijo?

- a) Oposición.
- b) Concurso-oposición.
- c) Concurso.
- d) Contratación laboral. ✓

92.- Al término del embarazo ¿Cuál de las siguientes cantidades de líquido amniótico deberá ser excedida para que se considere polihidramnios?:

- a) 1.000 ml.
- b) 2.000 ml. ✓
- c) 1.500 ml.
- d) 750 ml.

93.- Dentro de las amenorreas primarias no encontramos como causa:

- a) Prolactinoma.
- b) Hipotiroidismo.
- c) Síndrome de Sheehan.
- d) Panhipopituitarismo.

94.- En la serología de embarazada vacunada de hepatitis B, encontraremos:

- a) Ag Hbs positivo, anti Hbc positivo y Ag Hbe positivo.
- b) Anti Hbs Ag positivo y anti Hbc positivo, resto negativos.
- c) Anti Hbs Ag positivo y resto negativos.
- d) Ag Hbe positivo y resto negativos.

95.- ¿Qué puede verificar en la 2ª maniobra de Leopold?:

- a) La actitud fetal.
- b) La presentación.
- c) El fondo de útero.
- d) La posición fetal.

96.- ¿A qué se denomina síndrome de Potter?:

- a) A la acumulación anormal de líquido en los ventrículos cerebrales.
- b) Al pie zambo.
- c) A un defecto en el anillo umbilical.
- d) A la agenesia renal y alteraciones asociadas al oligohidramnios.

97.- ¿Qué instrumento utilizado en un parto actúa por pulsión y no por tracción?:

- a) Espátulas.
- b) Ventosa.
- c) Forceps.
- d) Kristeller.

98.- La conducta OMISIVA es una característica de la eutanasia:

- a) Indirecta.
- b) Pasiva.
- c) Genuina.
- d) Mística.

99.- La recomendación de tomar ácido fólico diariamente, además de prevenir malformaciones en el feto, previene a la mujer gestante de desarrollar:

- a) Anemia falciforme.
- b) Anemia ferropénica.
- c) Anemia megaloblástica.
- d) Policitemia.